

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

ЭнтероЗоо®

(Организация-разработчик: ООО «ТНК СИЛМА», Российская Федерация,
115573, город Москва, Шипиловская ул., д. 50, корп.1, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-9.23-4994№ПВР-3-9.23/03816

Общие сведения

Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: ЭнтероЗоо® (EnterоZoo®).

Международное непатентованное наименование: полиметилсилоксана полигидрат.

Лекарственная форма: паста для приема внутрь.

ЭнтероЗоо® в 100 г содержит в качестве действующего вещества полиметилсилоксана полигидрат – 60 г, а также вспомогательное вещество: воду очищенную.

По внешнему виду ЭнтероЗоо® представляет собой однородную пастообразную массу от белого до почти белого цвета без запаха, возможно расслоение.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства, после вскрытия тубы – 40 суток, остатки препарата после вскрытия саше хранению не подлежат. После вскрытия упаковки препарат следует предохранять от высыхания.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

ЭнтероЗоо® выпускают расфасованным по 100 г в тубы полимерные, снабженные алюминиевой мембраной и навинчивающимися крышками, по 15 г в саше из алюминиевой фольги и полимерной пленки.

Тубы поштучно или саше по 10 шт. вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4 °С до 30 °С.

ЭнтероЗоо® следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Фармакологические свойства

ЭнтероЗоо® относится к желудочно-кишечным средствам группы адсорбентов.

ЭнтероЗоо® - полимерное гелевидное кремнийорганическое соединение, имеющее пористую структуру. ЭнтероЗоо® обладает выраженными сорбиционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые аллергены и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Препарат сорбирует некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина, липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. ЭнтероЗоо® не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его моторику.

Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, не накапливается в органах и тканях и выводится из организма преимущественно в неизменном виде в течение 12 часов после приема.

Препарат ЭнтероЗоо® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Порядок применения

ЭнтероЗоо® назначают собакам, кошкам, домашним грызунам, декоративным птицам в качестве детоксикационного средства с лечебной и профилактической целью при заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией, диспепсией, диареей, при отравлениях ядовитыми веществами, токсинами эндогенной и экзогенной природы в том числе:

- острые отравления, включая кормовые отравления с симптомами острой диареи;
- тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи, вызванные солями тяжелых металлов, пестицидами и др.;
- острая диарея различной этиологии: бактериальная, вирусная (включая ротавирусы), пищевые отравления или применение антибиотиков;
- хроническая диарея различного происхождения;
- кормовые токсикоинфекции, включая поражения микотоксинами;
- кишечные инфекции различной этиологии: бактериальные, вирусные (включая ротавирусы), грибковые, вызванные простейшими с симптомами острой и хронической диареи.

При лечении острых отравлений и кишечных заболеваний ЭнтероЗоо® применяют в составе комплексной терапии.

Противопоказанием для применения ЭнтероЗоо® является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

ЭнтероЗоо® не имеет противопоказаний к применению беременным и лактирующим животным.

ЭнтероЗоо® применяют перорально, в смеси с кормом или с водой. Препарат вводят в ротовую полость при помощи пластикового шприца либо пипеточного насоса. Доза препарата определяется в зависимости от вида, возраста и массы животного. Для удобства измерения приблизительные эквиваленты рекомендованных доз препарата указаны в таблице в чайных и столовых ложках.

Приблизительный эквивалент: 1 чайная ложка = 5 г, 2 чайные ложки = 10 г, 1 столовая ложка = 15 г.

Рекомендованные дозы:

Животное	Разовая доза	Кратность применения	Способ применения
Собаки и щенки	До 4 кг - 5 г (1 чайная ложка); до 15 кг - 10 г (2 чайные ложки); 15-50 кг - 15 г (1 столовая ложка); более 50 кг - 20 г (1 столовая и 1 чайная ложки)	2 раза в день	Ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, в ином случае смешать с кормом или намазать на лакомство.
Кошки и котята	До 2 кг - 5 г (1 чайная ложка); более 2 кг - 10 г (2 чайные ложки)	2 раза в день	Ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, в ином случае смешать с кормом или намазать на лакомство.
Кролики, морские свинки, хорьки, нутрии	5 г (1 чайная ложка)	2 раза в день	Для выпаивания добавить к лекарственному препарату немного воды, перемешать, довести объем до 10-15 мл и перелить в поилку или ввести непосредственно в ротовую полость с помощью пластикового шприца.
Хомяки, мыши, крысы	2,5 г (½ чайной ложки)	2 раза в день	Для выпаивания добавить к лекарственному препарату немного воды, перемешать, довести объем до 5-10 мл и перелить в поилку или ввести непосредственно в ротовую полость с помощью пластикового шприца.
Декоративные птицы	До 1 кг - 2,5 г (½ чайной ложки); Более 1 кг - 5 г (1 чайная ложка)	1 раз в день	Для выпаивания добавить к лекарственному препарату немного воды, перемешать, довести объем до 5-10 мл и перелить в поилку или ввести непосредственно в ротовую полость с помощью пластикового шприца.

Рекомендуется применять ЭнтероЗоо® при первых признаках заболевания или отравления.

Острые отравления с симптомами острой диареи:

Первое введение – двойная разовая доза. Далее препарат применяют согласно схеме дозирования, в зависимости от вида и веса животного. После купирования симптомов диареи применять ЭнтероЗоо® в течение не более 5 дней.

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи:

Первое введение – двойная разовая доза. Далее препарат применяют согласно схеме дозирования, в зависимости от вида и веса животного. Продолжительность введения - 10-14 дней.

Профилактическая детоксикация:

Одна разовая доза согласно схеме дозирования, в зависимости от вида и веса животного в течение 10-14 дней.

Побочных явлений и осложнений при применении ЭнтероЗоо® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций, использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

Симптомы передозировки у животных при применении лекарственного препарата не выявлены.

Препарат ЭнтероЗоо® следует применять за 1-2 часа до или после приема других лекарственных средств или кормовых добавок, в связи с возможным нарушением их абсорбции из желудочно-кишечного тракта.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз ЭнтероЗоо® применение препарата следует продолжить согласно инструкции.

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «ТНК СИЛМА», Российская Федерация, 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Л.Толстого, д.32/2

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ФАРМАСИЛ», Российская Федерация, 115573, г. Москва, ул. Шиниловская, д. 50, корп. 1, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 5.